UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Química
Departamento de Química Inorgânica

IQG – 112

Modelos Atômicos e Espectroscopia

Prof. Daniel Grasseschi

A matéria é composta de átomos!

Menores partículas de um elemento

Átomos podem ser manipulados!

Modelos Atômicos

John Dalton - 1805

Átomos → Esferas maciças

Elementos → Definidos pelo tamanho e massa dos átomos

Indivisíveis

Elementos se combinam para formar compostos

Reações químicas → átomos são reorganizados, combinados ou separados

+

O → 16 unidades de massa

H → 1 unidade de massa cada

H₂O → 18 unidades de massa

Experimento de Goldstaein

1886 → Eugen Goldstein → Tudo de Raios anódicos

Cargas multiples de $+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Partículas Subatômicas

1896 → Bequerel → Radioatividade do Urânio

Marie Skłodowska Curie

“Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade”.

O elétron

1897 → J. J. Thomson → Relação carga/massa do elétron → $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

Modelo do Pudim de passas

Tubo de Raios Catódicos

1909 → Robert Milikan → carga do e^- → $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$\text{Massa do elétron} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.10 \times 10^{-28} \text{ g}$$

Modelo Nuclear do Átomo

1911 → Ernest Rutherford

Experiment

Volume ocupado pelo Núcleo

Volume ocupado pelos elétrons

Partículas Subatômicas

1919 → Ernest Rutherford → descoberta do próton

1923 → James Chadwick → descoberta do neutron

Particle	Charge	Mass (amu)
Proton	Positive (1+)	1.0073
Neutron	None (neutral)	1.0087
Electron	Negative (1-)	5.486×10^{-4}

→ Modelo próton-núcleo → Heisenber

Isótopos

ISÓTOPOS ESTÁVEIS E ISÓTOPOS INSTÁVEIS (RADIOATIVOS)

INSTÁVEIS
RADIOATIVOS
DECAIMENTO

ALFA

BETA

RAIOS
GAMA

Enxergando átomos!

Microscopia Eletrônica de Alta Resolução!

Enxergando átomos!

Grafeno

Microscopia de Força Atômica

Partículas Subatômicas

The Large Hadron Collider -CERN

Standard Model of Elementary Particles

		three generations of matter (fermions)				
		I	II	III		
QUARKS	mass	$\approx 2.2 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.28 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 173.1 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 125.09 \text{ GeV}/c^2$
	charge	$2/3$	$2/3$	$2/3$	0	0
	spin	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	0
		u up	c charm	t top	g gluon	H Higgs
		$\approx 4.7 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 96 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$	0	
		$-1/3$	$-1/3$	$-1/3$	0	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1		
	d down	s strange	b bottom	γ photon		
LEPTONS		$\approx 0.511 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 105.66 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.7768 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 91.19 \text{ GeV}/c^2$	
		-1	-1	-1	0	
		$1/2$	$1/2$	$1/2$	1	
		e electron	μ muon	τ tau	Z Z boson	
		$< 2.2 \text{ eV}/c^2$	$< 1.7 \text{ MeV}/c^2$	$< 15.5 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 80.39 \text{ GeV}/c^2$	
		0	0	0	± 1	
	$1/2$	$1/2$	$1/2$	1		
	ν_e electron neutrino	ν_μ muon neutrino	ν_τ tau neutrino	W W boson		

SCALAR BOSONS

GAUGE BOSONS

Próton

Neutron

Espectroscopia

Estuda a interação da luz com a matéria

Luz

1672 → Isaac Newton desenvolve a óptica geométrica → luz vista como partícula

1678 → Christian Huygens → Explica a refração da luz → teoria ondulatória da luz

Séc. XIX → T. Young, A. Fresnel, Maxwell → luz como ondas eletromagnéticas

Oscilação de um elétron sob influencia da luz

$$\lambda \cdot \nu = c$$

Espectro Eletromagnético

Espectro Eletromagnético

Tabela 3 – Unidades de comprimentos de nos comuns para radiações eletromagnéticas

Unidade	Símbolo	Comprimento (m)	Tipo de radiação
Angström	Å	10^{-10}	Raios X
Nanômetro	nm	10^{-9}	Ultravioleta, visível
Mícron	μm	10^{-6}	Infravermelho
Milímetro	mm	10^{-3}	Infravermelho
Centímetro	cm	10^{-2}	Microondas
Metro	m	1	TV, rádio

Espectros Atômicos

1672 → Dispersão da luz branca →

1814 → Fraunhofer →

Linhas de Fraunhofer

1859 → Kirchhoff e Bunsen → correspondência entre as linhas de Fraunhofer e a emissão de elementos quando aquecidos

Hidrogênio

Hélio

Neônio

Característico de cada elemento

Espectros Atômicos

Espectro do Hidrogênio

$$E = R \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2} \right)$$

Constante de Rydberg

$$R = \frac{2\pi^2 \mu Z^2 e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 h^2}$$

Primeira aparição do conceito de quantização de energia

O átomo de H

H → 1 próton + 1 elétron

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Força de Coulomb

$$F_{centrifuga} = \frac{m_e v^2}{r}$$

Elétron está sendo acelerado → emissão de radiação

Orbital em espira em direção o núcleo → colisão elétron-núcleo

Física Clássica → não explica a estrutura do átomo e o perfil dos espectros de emissão

Princípios de Mecânica Quântica

Explica a estrutura da matéria e suas interações com o meio

Radiação do corpo negro → Radiação emitida por um corpo aquecido

$$\rho(\lambda) = \frac{8\pi kT}{\lambda^4}$$

1900 → Max Plank

Radiação emitida → oscilações dos eletrons do material → **assumem energias discretas**

$$E = nh\nu$$

Energia do Oscilador

Frequência

$$\rho(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{e^{-hc/\lambda kT}}{1 - e^{-hc/\lambda kT}}$$

Princípios de Mecânica Quântica

1905 → A. Einstein → Efeito Fotoelétrico

Teoria de Bohr para o átomo de H

1911 → Niels Bohr

- O elétron apresenta uma orbita estacionária

- Elétrons se comportam como ondas estacionárias

Teoria de Bohr para o átomo de H

1911 → Niels Bohr

- O elétron apresenta uma orbita estacionária →

- Elétrons se comportam como ondas estacionárias →

$$2\pi r = n\lambda$$

For a hydrogen atom:

Electron wave resonance

$$n=1 \quad \lambda_1 = 2\pi r_1 = 6.28a_0$$

$$n=2 \quad 2\lambda_2 = 2\pi r_2 \\ \lambda_2 = 12.57a_0$$

$$n=3 \quad 3\lambda_3 = 2\pi r_3 \\ \lambda_3 = 18.85a_0$$

Wavelengths for hydrogen states.

$a_0 = 0.0529\text{nm} = \text{Bohr radius}$

Dualidade Onda x Partícula

Relação de de Broglie

1923 – 1923 → L. de Broglie: Partículas também apresentam propriedades ondulatórias

$$\text{onda} \leftarrow \lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \text{partícula}$$

$\lambda = \frac{h}{mv}$
: $v \rightarrow E$
de Broglie :
: $\lambda \rightarrow p$

Dualidade Onda x Partícula

Difração da luz

Dualidade Onda x Partícula

Experimento de Dupla Fenda

Partículas

Onda

Elétrons

Onda de Elétrons

Teoria de Bohr para o átomo de H

$$\tilde{\nu} = \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) R_H$$

- $n_1 = 1, n_2 = 2, 3, \dots$ Lyman series, ultraviolet
- $n_1 = 2, n_2 = 3, 4, \dots$ Balmer series, visible
- $n_1 = 3, n_2 = 4, 5, \dots$ Paschen series, infrared
- $n_1 = 4, n_2 = 5, 6, \dots$ Brackett series, far infrared
- $n_1 = 5, n_2 = 6, 7, \dots$ Pfund series, far infrared
- $n_1 = 6, n_2 = 7, 8, \dots$ Humphreys series, far infrared

Teoria de Bohr para o átomo de H

Por exemplo: se o elétron move-se de $n_i = 3$ para $n_f = 1$, temos:

$$\Delta E = (- 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = (- 2,18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{8}{9} \right) = - 1,94 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Sabendo a energia para o fóton emitido, podemos calcular sua frequência ou seu comprimento de onda. Para o comprimento de onda, temos:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6,63 \times 10^{-34} \text{ Js})(3,00 \times 10^8 \text{ m/s})}{1,94 \times 10^{-18} \text{ J}} = 1,03 \times 10^{-7} \text{ m}$$

O sentido do fluxo de energia é indicado quando se diz que o fóton de comprimento de onda $1,03 \times 10^{-7} \text{ m}$ foi **emitido**.

Espectro do He atômico

Exercício!

Baseado no modelo de Bohr proponha uma equação para explicar o espectro de He^+ . Discuta se essa aproximação é válida par o átomo de He.